

**Дети 6 месяцев** – третья прививка против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Третья прививка против вирусного гепатита В. Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

**Дети 12 месяцев** – прививка против кори, краснухи, эпидемического паротита. Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска).

**Дети 15 месяцев** – ревакцинация против пневмококковой инфекции.

**Дети 18 месяцев** – первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

**Дети 20 месяцев** – вторая ревакцинация против полиомиелита.

**Дети 6 лет** – ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.

**Дети 6-7 лет** – ревакцинация против туберкулеза. Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка.

**Дети 14 лет** – третья ревакцинация против дифтерии, столбняка. Третья ревакцинация против полиомиелита.

*Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты вузов, взрослые работающие по отдельным должностям (медработники, работники общественного транспорта, работники коммунальной сферы и др.), взрослые старше 60 лет* – ежегодная вакцинация против гриппа.

*Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее* – вакцинация против вирусного гепатита В по схеме.

*Дети от 1 года до 18 лет и девушки от 18 до 25 включительно* – вакцинация от краснухи по схеме.

Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори – вакцинация против кори (интервал между

первой и второй прививкой должен составлять не менее 3 месяцев).

#### **Как готовить ребенка к прививке?**

Перед прививкой и после нее постарайтесь не включать в питание ребенка новых пищевых продуктов, а также продуктов, на которые ваш ребенок реагирует аллергическими проявлениями. В это время следует оградить ребенка как от переохлаждения, так и от перегревания, а также от контактов с инфекционными больными. *Врачу необходимо сообщить:*

- Не болеет ли ребенок сегодня, не болел ли он в течение месяца
- Нет ли острых инфекционных больных в окружении ребенка
- О возможных аллергических реакциях на лекарственные препараты, продукты питания
- Не отмечалось ли тяжелой реакции на предшествующее введение вакцины

Все выполненные ребенку прививки вносятся в «сертификат о профилактических прививках».

#### **В чем нуждается ребенок после прививки?**

Во внимательном отношении к себе со стороны родителей. В случае изменения поведения ребенка, повышения температуры до 38°C и выше, появления жалоб, родители должны обязательно обратиться к врачу.

**ПОМОГИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ВЫРАСТИ  
ЗДОРОВЫМ.  
ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ СВОЕВРЕМЕННО!**



## Родителям о профилактических прививках детям

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиенического  
образования населения» Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
( г.Москва, 1й Смоленский пер.д 9, стр.1  
[cgon@cgon.ru](mailto:cgon@cgon.ru), тел.8 (499) 2418628)



**ВАКЦИНАЦИЯ** – надежная защита Вашего ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, гепатит В, корь, эпидемический паротит (свинка),

краснуха.

На территории России все прививки делаются в соответствии с **Национальным календарем профилактических прививок**, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 марта 2014г № 125н.

**Чем опасны заболевания, прививки против которых включены в календарь?**

**Полиомиелит** – вирусное заболевание, поражающее в основном спинной мозг. Приводит к параличам, которые остаются на всю жизнь и делают заболевших инвалидами.

**Гепатит В** – вирусная инфекция, широко распространенная во всем мире. Вызывает поражение печени, вплоть до цирроза или рака печени. Примерно у 1% заболевших развивается молниеносная форма, почти всегда заканчивающаяся летально. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от гепатита погибает более 1 000 000 человек в мире. Эффективность вакцинации 95-98%.

**Туберкулез** – бактериальная инфекция, вызываемая микобактерией туберкулеза человека или животных. Поражаются легкие, другие внутренние органы, кожа, кости. Наиболее тяжелой формой является туберкулезный менингит. Особенно чувствительны к туберкулезу маленькие дети.

**Коклюш** – вызывается коклюшной палочкой. Заболевание проявляется сильными приступами кашля. Опасно осложнениями – воспалением легких (до 25% заболевших), а у маленьких детей – поражением головного мозга (1%), судорогами (3%). При заболевании коклюшем непривитых детей в возрасте до 1 года умереть может каждый пятый ребенок.

**Дифтерия** – инфекция, которую вызывает дифтерийная палочка. При дифтерии возникает особая тяжелая ангина и выраженная интоксикация. Заболевание может осложняться поражением сердца, почек, нервной системы. Частота летальных исходов 10-20% заболевших. Антибиотики при дифтерии неэффективны.

**Столбняк** – вызывается токсином столбнячной палочки, которая проникает в организм через поврежденные кожные покровы, при травмах, ранах. Очень тяжелое, часто смертельное заболевание, проявляющееся поражением нервной системы. Сопровождается высокой летальностью вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.

**Корь** – острое вирусное заболевание, характеризующееся симптомами общей интоксикации и сыпью. Заболевание осложняется развитием отита (7-9%), пневмонии, не поддающейся антибиотикотерапии (1-6%), энцефалита (0,1%). Возможны смертельные исходы. Риск тяжелых осложнений и смерти высок у маленьких детей.

**Эпидемический паротит (свинка)** – у 10% заболевших осложняется серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка, перенесенная в детстве, является одной из причин развития мужского и женского бесплодия, так как вирус может поражать яички и яичники.

**Краснуха** – в детстве заболевание протекает относительно легко, но представляет большую опасность для беременных, которые заражаются от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто (в 50-70%) приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам, мертворождениям.

Инфекции, вакцинация против которых **рекомендована детям:**

- Гепатит А – острое вирусное заболевание, поражающее печень
- Гемофильная В инфекция является причиной 40% гнойных менингитов у маленьких детей. Умирает 5-25% заболевших. 40% заболевших инвалидизируются в результате поражения нервной системы, органов зрения, слуха.
- Пневмококковая инфекция – вызывается бактериями и характеризуется тяжелым заболеванием ушей, легких, других органов, возможно заражение крови, менингит.
- Папилломавирусная инфекция

На территории России все прививки, включенные в **Национальный календарь профилактических прививок**, осуществляются во всех государственных и муниципальных организациях здравоохранения бесплатно и с согласия родителей.

Прививки, полученные ребенком в детстве, создают иммунитет, то есть невосприимчивость организма к инфекциям.

**Новорожденные (в первые 24 часа жизни ребенка)** – первая вакцинация против вирусного гепатита В.

**Новорожденные на 3-7 день жизни** – вакцинация против туберкулеза.

**Дети 1 месяц** – вторая вакцинация против вирусного гепатита В.

**Дети 2 месяца** – третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска). Первая вакцинация против пневмококковой инфекции.

**Дети 3 месяца** – первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска).

**Дети 4,5 месяцев** – вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции. Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска).